



Si es Bayer,  
es bueno.

**COMPOSICIÓN:**

imidacloprid.....2,15 g  
cebo y excipientes c.s.p.....100 g

**PRECAUCIONES:**

- Lea el prospecto adjunto antes de usar el producto.
- Mantener alejado de niños o animales domésticos.
- Peligrosa su ingestión.
- No aplicar sobre alimentos ni en superficies en contacto con los mismos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.
- No beber, comer, ni fumar durante la aplicación.
- No almacenar junto con alimentos.
- Destruir y eliminar el envase vacío en la basura.
- Aplicar con guantes.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión accidental concurrir al centro asistencial más próximo, llevando el envase/ rótulo del producto. Lavar con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.

**AVISO AL MÉDICO:** Clase IV

Nombre común: Imidacloprid, Grupo químico: Nitroguanidina

Aplicar: Tratamiento sintomático

**Argentina:** Bayer S.A.

R. Gutiérrez 3652-(B1605EHD)- Munro, Bs. As.  
Tel.: 0800-4444-2822 (CUCA) - (011) 4762-7000  
www.proteccionambiental.com.ar  
e-mail: saludambiental@bayercropscience.com

**Bolivia:** Bayer Boliviana Ltda.

Av. Cristóbal de Mendoza N° 164, Edif. Imcruz 3° Piso, Santa Cruz Bolivia  
Tel.: 3-15-3300 - Fax.: 3-15-3349

**Paraguay:** Bayer S.A.

Av. Santa Teresa 2245 casi Avda. Aviadores del Chaco, Asunción, Paraguay  
Te: 595 21 617 3500  
Representa y Distribuye en Paraguay: Bayer SA  
RUC: 800 16201-3  
Director Técnico: Ing. Química Victoria Costa de Maluf  
Reg. Prof. 2307




**Blattanex**<sup>®</sup>  
ULTRA GEL

**Mata cucarachas**

**Gel cebo cucarachicida**

**FORMA DE USO**

- Presione la tapa de la jeringa hacia abajo y tire de la misma.
- Aplique el gel directamente presionando suavemente el émbolo de la jeringa.
- Se aplica en forma de puntos/gotas de 2 mm de diámetro por m<sup>2</sup> o metro lineal.
- El gel se adhiere a cualquier tipo de superficie.
- Revisar periódicamente los puntos de aplicación y reaplique en caso de que el gel haya sido consumido.
- Máximo control a partir de 5 a 7 días de aplicado.
- Aplicar en lugares de difícil acceso para niños y mascotas.
- No colocar en lugares donde pueda haber riesgo de cortocircuito.



**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:**

**Capital Federal:** Centro Toxicológico de Hospital de Niños,  
Tel.:(011)-4962-6666 / 2247 / 0800-444-8694

**Buenos Aires:** Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo  
Tel.:(011) 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-0160 Hospital de Niños de La Plata,  
Tel.:(0221) 451-5555 / 0800-222-9911

**Rosario:** Centro Toxicológico TAS, Tel.:(0341) 424-2727 / 448-0077 (At. las 24 hs.)

**Córdoba:** Hospital de Urgencias, Tel.:(0351) 427-6200 Int.4135

**Bolivia:** Centro de Info. Toxicológica (Hospital Universitario Japonés),  
3er anillo externo, Avda. Japón, Sta. Cruz, Bolivia. Tel.:800-10-6966.

**Paraguay:** Emergencias Médicas: 595 21-204-800  
Tecnico Responsable: Verónica Patricia Acosta Ubaldi

**Argentina:** R.N.P.U.D. N° 0640076

Imp. BAYER R.N.E. N° 020032212

**Bolivia:** Registro autorizado: LHIT-MSD/INSO N° 1153/08

**Paraguay:** Venta autorizada por D.N.V.S. Certificado N°: 00251-01-D2

**Contenido: 10g**

Origen: Francia



**ATENCIÓN - CUIDADO**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.  
LEER ÍNTEGRAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**



Bayer CropScience